


FATOS-CHAVE


sobre cuidados neonatais

Mais de 13 milhões de bebês nascem cedo demais todos os anos no mundo.




Isso representa mais de 1 em cada 10 bebês.

Em todo o mundo, o nascimento prematuro é a principal causa de morte em crianças com menos de 5 anos de idade.




Quase metade das crianças com menos de cinco anos de idade morre no período neonatal (primeiros 28 dias).

Perda de vida de recém-nascidos



Ainda assim, cerca de 1 milhão de bebês perdem a vida a cada ano por terem nascido muito cedo.

Razões para a perda de vidas



A maioria das mortes de recém-nascidos (78%) se deve a complicações relacionadas à prematuridade, complicações durante o parto, infecções e defeitos congênitos.

ESTÁGIOS DO NASCIMENTO PREMATURO



COMO OS SENTIDOS DO SEU BEBÊ SE DESENVOLVEM



Sensível ao toque ao redor da boca.



Formam-se receptores gustativos na língua.

7-8
semanas



O bebê pode sugar o polegar.



As mãos do bebê começam a se abrir.

12-14
semanas



As estruturas auditivas começam a se desenvolver.

20
semanas



Sensível ao toque em todo o corpo.



Reflexo de preensão acionado pelo toque na palma da mão.



Detecta sabores no líquido amniótico.

24
semanas



Reage ao gosto amargo.

26-27
semanas



Começa a se movimentar em resposta a sons.



Agarra-se com os dedos dos pés quando o pé é tocado.



Sabores doce e azedo.



Reconhece vozes.

28-29
semanas



Reconhece a voz da mãe.

32
semanas



As pupilas se contraem em resposta à luz.



Prefere sabores doces.



Reconhece sons familiares.



Começa a acompanhar objetos em movimento.

34
semanas



Reconhece a voz, a linguagem e o padrão de fala da mãe.

35-40
semanas




Segue objetos em movimento.



O desenvolvimento da visão se acelera após 40 semanas.

PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO



ENTRE EM AÇÃO!

Se você tiver um ou mais dos seguintes **sinais e sintomas**, ligue para o seu médico ou vá imediatamente ao hospital - não importa quando isso ocorra durante a gravidez.



SANGRAMENTO VAGINAL



CONTRAÇÕES



VAZAMENTO OU CORRIMENTO VAGINAL



AUMENTO DA DOR LOMBAR



PRESSÃO PÉLVICA



DIMINUIÇÃO DOS MOVIMENTOS DO BEBÊ



BARRIGA OU ÚTERO ENDURECIDO

ACOMPANHAMENTO DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO


SINAIS DE ALERTA E QUANDO PROCURAR AJUDA IMEDIATAMENTE

É importante saber que a **pré-eclâmpsia**, sem as intervenções necessárias de um profissional de saúde qualificado, pode se manifestar em síndromes com risco de vida, como a **HELLP** ou - como o nome sugere - a **eclâmpsia**.



SINAIS DE ALERTA DA PRÉ-ECLÂMPSIA

- hipertensão arterial
- inchaço nos pés, pernas ou pulsos (fazendo com que pareçam mais grossos do que o normal)
- proteína na urina (verificada por um profissional de saúde)



Ligue e/ou consulte seu médico se você tiver um único sinal ou sintoma.



SINAIS DE ALERTA DA SÍNDROME HELLP

HEMÓLISE, ENZIMAS HEPÁTICAS ELEVADAS E PLAQUETAS BAIXAS)

- dor na parte superior direita de sua barriga
- sentir-se ou estar doente (náuseas e vômitos)
- sentir-se extremamente indisposta, ansiosa ou em pânico
- amarelamento da pele e/ou coceira na pele



SINAIS DE ALERTA DE ECLÂMPSIA

- dor de cabeça
- zumbido nos ouvidos
- sensação de tontura
- desmaio (perda de consciência) e movimentos fortes e bruscos (hiperreflexia)
- visão turva ou outra deficiência visual
- sentir-se nauseado ou vomitar