


PRISE EN CHARGE DES GROSSESSES À RISQUE

LES SIGNES D'ALERTE ET QUAND DEMANDER IMMÉDIATEMENT DE L'AIDE

Il est important de savoir que la **prééclampsie**, sans les interventions nécessaires d'un professionnel de santé qualifié, peut se manifester par des syndromes mettant la vie en danger tels que le **HELLP** ou – comme son nom l'indique – **l'éclampsie**.

SIGNES D'ALERTE DE LA PRÉÉCLAMPSIE

- hypertension artérielle
- gonflement des pieds, des jambes ou des poignets (ce qui les fait paraître plus épais que d'habitude)
- protéines dans l'urine (vérifié par votre professionnel de santé)



Appelez et/ou consultez votre professionnel de santé si vous avez même un signe ou symptôme.

SIGNES D'ALERTE DU SYNDROME HELLP

(HÉMOLYSE, ENZYMES HÉPATIQUES ÉLEVÉS ET PLAQUETTES BASSES)

- douleur dans le côté supérieur droit de votre ventre
- sensation de malaise ou vomissements (nausées et vomissements)
- sensation de grande fatigue, d'anxiété ou de panique
- jaunissement de la peau et/ou démangeaisons cutanées

SIGNES D'ALERTE DE L'ÉCLAMPSIE

- maux de tête
- bourdonnements ou sifflements dans les oreilles
- sensation de vertige
- perte de connaissance (évanouissement) et mouvements forts et saccadés (hyperréflexie)
- vision floue ou autres troubles de la vue
- sensation de malaise ou vomissements (nausées)